Capex® 2
Mode d'emploi

FR

Généralités
Le capua (*Adoxophyes orana*) fait 2 générations par an: 1ère génération d'été avec des dégâts visibles en juin/juillet; 2ème génération d'hiver (larves diapausantes) avec des dégâts visibles en août/septembre, ainsi qu'au printemps de l'année suivante (avril/mai).

Mode d'action
Capex® 2 est un insecticide biologique hautement sélectif, à base d'un virus spécifique. Il agit par ingestion uniquement contre les chenilles de capua. Capex® 2 est hautement sélectif e n'a aucun effet négatif sur les autres organismes (auxiliaires, abeilles, poissons, mammifères et humains). Capex® 2 ne laisse pas de résidus chimiques sur les fruits. Capex® 2 a une bonne résistance au lessivage.

FR

Emploi
Arboriculture
Capua 0,1 l/ha (0,006%)

Appliquer sur les jeunes larves (L1 à L3). Traiter avec suffisamment d'eau (>400 l/ha). La bouillie doit être répartie de manière régulière sur l'ensemble de la culture. Répéter les applications à intervalle de 8–10 jours, pendant la période d'activité des larves L1–L3 (en général 2 applications).

Applications de printemps
Pour une efficacité maximale, appliquer Capex® 2 sur les jeunes larves (jusqu'au stade L3). La majeure partie des larves ne meurent cependant qu'au dernier stade larvaire. Les larves reprennent leur activité au printemps dès l'apparition des pousses sur les arbres. Elles se cachent dans les tissages sur les inflorescences.

Faire un 1er traitement dès l'apparition des premières larves. Cette application coïncide généralement avec le stade D de Golden Delicious. Faire une 2ème application 7 à 10 jours plus tard.

Applications d'été
Capex® 2 peut aussi être appliqué en été seulement ou en complément du traitement de printemps. Le traitement d'été permet de réduire les dégâts de la génération d'automne, ainsi que les populations de capua. Appliquer Capex® 2 lorsque les premières larves sont visibles sur les pousses. Effectuer une 2ème application 8 jours après.



FR

Préparation de la bouillie
Remplir le pulvérisateur avec ¾ du volume d'eau nécessaire, enclencher le brasseur, puis ajouter la quantité de Capex® 2 nécessaire. Ajouter les partenaires de mélange éventuels, puis compléter avec l'eau manquante. Appliquer la bouillie immédiatement.

Miscibilité
Capex® 2 est miscible avec les insecticides et fongicides usuels tant que le pH de la bouillie reste entre 5–8,5. Ne pas mélanger Capex® 2 avec des produits acidifiants (pH de la bouillie <5) tels Myco-San/Myco-Sin, ni alcalinisants (pH de la bouillie >8,5) tels les spécialités à base de savon, comme par ex. Biofa Cocana. Ne pas mélanger Capex® 2 avec des produits contenant du cuivre.

Pour de plus amples informations sur la miscibilité de nos produits, consulter le tableau «miscibilité des produits» en dernière page de notre catalogue ou sous www.biocontrol.ch.

Délai d'attente
1 Semaine

Stockage
Pour le stockage intermédiaire, stocker au réfrigérateur (5 °C), au sec et à l'abri de la lumière. Congelé (–18 °C), il se conserve plusieurs années sans diminution d'efficacité.

Premier secours
Remarques générales: Aucune mesure particulière n'est requise.
Après inhalation: Donner de l'air frais. Assistance respiratoire si nécessaire. Tenir le malade au chaud. Si les troubles persistent, consulter un médecin. L'inspiration est possible seulement lors de produit chauffer.

FR

Après contact avec la peau: Enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé. Laver immédiatement à l'eau. En cas d'irritation persistante de la peau, consulter un médecin.
Après contact avec les yeux: Rincer les yeux, pendant plusieurs minutes, sous l'eau courante en écartant bien les paupières. Si les troubles persistent, consulter un médecin.

Après ingestion: Si les troubles persistent, consulter un médecin. Aucune symptômes et effet connu.

Indications destinées au médecin
Traitement: Traitement symptomatique (décontamination, fonction vital), aucune antidot connue.